

Produodopa[®]

(foslevodopa/foskarbidopa)

För behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

Denna patientguide innehåller viktig säkerhetsinformation som du bör känna till.

Ha denna guide till hands när du förbereder dig inför användning av detta läkemedel.

Varför ska jag läsa denna patientguide?

Produodopa® är en medicin som används för att behandla symptom vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Produodopa används när andra mediciner inte längre fungerar lika bra för att behandla sjukdomens symptom.

Du eller din närstående kommer administrera denna medicin under din hud genom en liten plastslang (plastkanyl) i området runt din navel. Detta område kallas för infusionsställe.

Medicinen ges genom slangen, utan avbrott under 24 timmar per dygn.

En del personer som använder Produodopa kan få hudproblem i området där plastkanylen går in i kroppen.

Dessa hudproblem kan vara:

– **en hudinfektion.** Det är när bakterier kommer in i huden.

En hudinfektion kan bli allvarlig om bakterierna når blodet och sprider sig i kroppen. Det kallas blodförgiftning.

– **en hudreaktion.** Det är när huden blir irriterad/inflammerad.

Denna patientguide kommer lära dig eller din närstående följande:



Hur infusionsstället ska väljas



Hur en infektion eller reaktion vid infusionsstället känns igen



Vad du kan göra för att minska risken för en infektion eller reaktion vid infusionsstället



Vad du ska göra om du får en infektion eller reaktion vid infusionsstället



Var du hittar mer information om din medicin



Hur du väljer infusionsställe

Det är viktigt att du byter infusionsställe regelbundet. Det hjälper till att hålla huden frisk och gör att medicinen kan ges på rätt sätt.

Du kan använda din mage som infusionsställe om inte din läkare säger till dig att använda ett annat ställe. Se till att stället du väljer ligger minst 5 cm (ungefär lika långt som ditt lillfinger) från din navel.


- Undvik området där ditt skärp sitter eftersom huden där kan bli irriterad av trycket från skärpet.
- Undvik hud som har ärr, är hård eller har bristningar.
- Undvik hudveck eller ställen där huden ofta veckar sig naturligt.
- Använd ett nytt infusionsset (plastkanyl/slang), varje gång du byter infusionsställe.

Byt infusionsställe var 3:e dag. Du kan behöva byta ställe oftare än så om du märker förändringar i din hud (såsom rodnad, svullnad och smärta).

Ditt nya infusionsställe ska vara minst 2,5 cm (ungefär lika långt som bredden av två fingrar) från det ställe du använde sist.

När du har använt ett infusionsställe, använd inte samma ställe förrän efter 12 dagar. Det hjälper din hud att läka helt.

Det finns olika sätt att hjälpa dig komma ihåg att inte använda samma infusionsställe för tidigt. Ett sätt är att föreställa dig att din mage är en klocka. Du kan fästa din plastkanyl vid olika "tvåtimmarsintervall" varje gång. Du kan starta klockan 12, sedan klockan 2 och därefter klockan 4 osv.




Skriv ner datum och plats för ditt infusionsställe, så att du lättare kommer ihåg.



Hur du upptäcker en infektion eller reaktion vid infusionsstället

Var uppmärksam på hudförändringar på det ställe där plastkanylen går in i huden. Hudförändringar kan uppstå med eller utan feber och inkludera:

- rodnad
- huden känns varm när du rör den
- svullnad
- ömhet/smärta
- förändringar i hudfärgen när du trycker på huden





Vad du kan göra för att minska risken för en infektion eller reaktion vid infusionsstället

Infektioner eller reaktioner vid infusionsstället kan uppkomma. Nedan följer saker att tänka på när du förbereder infusionen.



Förbered din infusion på ett ställe med god belysning och som är rent samt har en plan yta (såsom ett bord).



Se till att hålla infusionsstället och infusionssetet rent och sterilt när du förbereder infusionen.



Tvätta alltid händerna med tvål och vatten och torka dem med en pappershandduk. Rör inte vid något som inte är rent efteråt.



Låt inte sprutspetsen, flaskadaptorn, slangens eller kopplingens vidröra en yta som inte är ren.



Var noggrann med att slänga använt material som kan vara kontaminerat (inte rent).



När du har valt infusionsställe, torka av huden med en spritkompress. Var noga med att bara torka i en och samma riktning så att du inte kontaminerar det rengjorda stället. Låt området torka i minst 1 minut.

Byt infusionsställe var 3:e dag eller oftare om du får en hudförändring (såsom rodnad, svullnad och smärta)



När du väljer ett nytt infusionsställe, välj inte samma ställe som du använt de 12 senaste dagarna. Det kommer hjälpa din hud att läka helt.



Det ska alltid vara ett avstånd på 2,5 cm (ungefär lika långt som bredden av två fingrar) från det senaste infusionsstället du använde.



Använd alltid en ny plastkanyl och en ny slang när du byter infusionsställe.



Klipp bort eventuella hårstrån runt infusionsstället. Det kommer göra att plastkanylens klisterlapp fäster bättre på din hud. Om du måste raka din hud, vänta en dag med att använda det infusionsstället.



Använd bekväma kläder som inte irriterar huden.



Vad du ska göra om du får en infektion eller reaktion vid infusionsstället

Byt infusionsställe – vänta inte 3 dagar med att byta.
Kontakta läkare eller sjuksköterska om du får följande symtom:

- rodnad
- huden känns varm när du rör vid den
- svullnad
- ömhet/smärta
- förändringar i hudfärgen när du trycker på huden

Använd inte ett infekterat infusionsställe igen på minst 12 dagar eller tills dess att det läkt.



Här kan du hitta mer information om din medicin

För mer information om din medicin, Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa), läs bipacksedeln och bruksanvisningarna som följer med medicinen. Information om din medicin finns även på www.fass.se.

För att rapportera biverkningar för din medicin, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, webbplats: www.lakemedelsverket.se eller kontakta AbbVie via info@abbvie.se.